

DICOPUR® COMBI

Erbicida selettivo per il diserbo dei cereali in concentrato solubile

DICOPUR COMBI

Composizione

100 grammi di prodotto contengono
2,4-D puro gr 24,7 (pari a 275 g/l di p.a. puro)
(da sale dimetilamminico)
MCPA puro gr 25,0 (pari a 275 g/l di p.a. puro)
(da sale dimetilamminico)
Coformulanti q.b. a gr.100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 – Nocivo se ingerito. H332 – Nocivo se inalato. H315 – Provoca irritazione cutanea. H318 – Provoca gravi lesioni oculari.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P304 + P340 – In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P301 + P312 – In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un centro antiveneni o un medico. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P332 + P313 – In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P362 – Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P305 + P351 + P338 – In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione:

NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter-Strasse 25 - A-4021 Linz (Austria)
rappresentata in Italia da **Nufarm Italia S.r.l.** Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna. Tel. 051 0394022

Officine di produzione:

NUFARM GmbH & Co KG - St. Peter-Strasse 25 - A-4021 Linz (Austria)
Nufarm S.A.S. - Notre Dame de la Garenne, 27600 Gaillon (Francia)

Distribuito da:

UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523

Registrazione n. **10220** del **09/12/1999** del Ministero della Sanità

Contenuto netto: lt 1 — 2 — 5 — 10

Partita n



PERICOLO

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: 2,4-D 24,7% e MCPA 24,9% i quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea.

Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG.

Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte Exitus per collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica. Ospedalizzare.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveneni.

MODALITA' D'IMPIEGO

Caratteristiche

DICOPUR® COMBI è un erbicida ormonico ad impiego di post-emergenza precoce, efficace anche a temperature relativamente basse (non inferiori a 8 °C). Il prodotto viene assorbito sia dalle foglie sia dalle radici. Non essendo volatile riduce al minimo il rischio di danneggiare le colture sensibili vicine.

Erbe infestanti sensibili al DICOPUR® COMBI:

Atriplex patula (Atriplice), Brassica nigra (Senape nera), Chenopodium album, (Farinello comune), Capsella bursa-pastoris (Borsa pastore comune), Cirsium arvense (Stoppione), Ranunculus arvensis (Ranuncolo dei campi), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus arvensis (Grespino dei campi), Thlaspi arvense (Erba stoma), Vicia spp. (Veccia);

Erbe infestanti mediamente sensibili al DICOPUR® COMBI:

Anagallis arvensis (Centocchio), Centaurea spp. (Fiordalisi), Cera-

stium holosteoides, (Peveriva), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Euphorbia helioscopia (Erba calenzuola), Fumaria officinalis (Fumaria), Galeopsis tetrahit (Canapa selvatica), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Lithospermium arvense (Strigolo o Migliasole), Myosotis arvensis (Miosotide dei campi), Papaver rhoeas (Papavero), Plantago spp. (Plantaggini), Rumex acetosella (Acetosella minore), Solanum nigrum (Erba morella), Sonchus asper (Grespino spinoso), Sonchus oleraceus (Grespino comune), Taraxacum officinale (Soffione), Urtica urens (Ortica minore).

Dosi - Epoche - Modalità d'impiego

Epoca d'impiego: su frumento, orzo, avena, segale dalla fine dell'accestimento all'inizio dello stadio di botticella, quando le infestanti sono in attiva crescita alla dose di 0,8 - 1,6 l/ha. Mais e sorgo: in post-emergenza, nelle fasi iniziali della coltura alla dose di 0,30-0,40 l/ha. Impiegare la dose più alta a basse temperature ed in presenza di infestanti resistenti.

Volume d'irrorazione: 250-400 l/ha

Numero massimo di trattamenti: 1

COMPATIBILITÀ

Il DICOPUR® COMBI non deve essere miscelato con fungicidi e insetticidi.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

FITOTOSSICITÀ

Il DICOPUR® COMBI non è fitotossico per i cereali indicati in etichetta. Può essere fitotossico per le colture di erba medica e trifoglio nel caso di tra semina di queste colture nella coltura del grano. Pertanto effettuare il trattamento almeno 15 giorni prima della loro semina. Le attrezzature impiegate per il trattamento con il DICOPUR® COMBI devono essere accuratamente pulite e lavate ripetutamente con acqua calda e soda prima di essere usate per altri trattamenti antiparassitari.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è tossico per gli animali domestici e il bestiame.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti **70** giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: DA IMPIEGARE ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE; SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE O CORSI D'ACQUA
NON OPERARE CONTRO VENTO; DA NON VENDERSI SFUSO;
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON; DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

DICOPUR® - Marchio depositato dalla Nufarm