

ETOFUM - FL ERBICIDA SELETTIVO PER LA COLTURA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA MECCANISMO D'AZIONE: INIBITORE DELLA SINTESI LIPIDICA - CODICE HRAC: N	
Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Etofumesate puro: g 44.4 (500 g/L) Coformulanti q.b. a g 100	ATTENZIONE 
INDICAZIONI DI PERICOLO H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.	
CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.	
Titolare dell'autorizzazione: UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300 Distribuito da: UPL Italia S.r.l. - Via Terni 275, Località San Carlo, 47522 Cesena (FC) Tel. 0547 661523; SCAM S.p.A. - Strada Bellaria 164, 41126 Modena Tel. (+39) 059 586511 Stabilimenti di produzione: UPL Europe Ltd. Sandbach, Cheshire, CW113QQ Gran Bretagna; CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda); Arysta Lifescience Ougrée Production SPRL – Ougrée (Belgio) Stabilimento di rietchettatura: ARCO Logistica S.r.l. – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara Registrazione del Ministero della Salute N° 8874 del 10.06.1996	
Contenuto netto: 0.5-1-2-3-5-10-20 L	Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 metri da corpi idrici superficiali per gli usi pre-emergenza (barbabietola a semina primaverile e autunnale) e post-emergenza (barbabietola a semina autunnale).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: ETOFUM-FL è un diserbante selettivo che viene impiegato per il diserbo della barbabietola da zucchero a semina primaverile e autunnale. Il prodotto agisce per assorbimento radicale e fogliare sulle infestanti quando sono in fase di germinazione o allo stadio giovanile.

Si consiglia di impiegare il prodotto in miscela con altri erbicidi ad azione complementare quali ad esempio formulati a base di metamitron, lenacil, fenmedifam, ecc...

ETOFUM-FL é efficace contro le seguenti principali infestanti: *Avena* spp. (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Apera spica-venti* (Capellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Setaria viridis* (Falso panico), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Spergula arvensis* (Renaiola comune), *Stellaria media* (Centocchio).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Barbabietola a semina primaverile

- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2 per ettaro in combinazione con formulati a base di Lenacil, Metamitron o altro erbicida complementare, in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione. Nel trattamento di pre emergenza intervenire subito dopo la semina e prima dell'emergenza delle infestanti.
- Post-emergenza: litri 1-1,2/ha in combinazione con formulati a base di Fenmedifam od altro erbicida complementare, in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Barbabietola a semina autunnale

- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2/ha in combinazione con formulati a base di Lenacil o altro erbicida complementare, in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione.
- Post-emergenza: litri 1.2-1.5/ha con 5-6 litri di Fenmedifam o altro erbicida complementare, in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Non superare la dose massima di 1 kg/ha di etofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.

Avvertenza: nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza il prodotto non si deve impiegare su terreni sabbiosi e con alto contenuto di sostanza organica (più del 5%). Dopo il trattamento di pre-emergenza, il terreno deve essere sufficientemente umido; in caso contrario effettuare un intervento irriguo. Nel caso si dovesse effettuare una risemina di altra coltura, realizzare prima un'aratura profonda.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con i più comuni agrofarmaci registrati per l'uso su barbabietola da zucchero. In caso di dubbio effettuare un saggio preliminare.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: quando erbicidi con la stessa modalità d'azione sono utilizzati più volte per diversi anni nello stesso appezzamento, può aver luogo la selezione di biotipi resistenti. Questi possono propagarsi e diventare dominanti. Un'infestante è considerata resistente a un erbicida se sopravvive ad un trattamento correttamente eseguito alla dose raccomandata. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, alternare o miscelare ETOFUM-FL con prodotti aventi una differente modalità d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche alternative di controllo delle infestanti (es. la rotazione culturale, gli interventi meccanici e la falsa semina).

Uso consentito solo fino allo stadio di sviluppo BBCH 18

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso – Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua – Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

**Segue etichetta con autorizzazione in
deroga su colture portaseme di
barbabietola da foraggio, bietole
rosse, bietole da foglia, bietole da
taglio e bietole da costa
dal 11 febbraio 2025 al 10 giugno 2025**

ETOFUM - FL ERBICIDA SELETTIVO PER LA COLTURA DELLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO, (*) BARBABIETOLA DA FORAGGIO E BIETOLE DA ORTO, IN SOSPENSIONE CONCENTRATA MECCANISMO D'AZIONE: Gruppo HRAC/WSSA 15 (già gruppo HRAC K3)	
Composizione 100 grammi di prodotto contengono: Etofumesate puro: g 44.4 (500 g/L) Coformulanti q.b. a g 100	ATTENZIONE 
INDICAZIONI DI PERICOLO H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene: 1,2-benzisothiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.	
CONSIGLI DI PRUDENZA P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale. (*) P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.	
Titolare dell'autorizzazione: UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A. Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300 Distribuito da: UPL Italia S.r.l. - Via Terni 275, Località San Carlo, 47522 Cesena (FC) Tel. 0547 661523; SCAM S.p.A. - Strada Bellaria 164, 41126 Modena Tel. (+39) 059 586511 Stabilimenti di produzione: UPL Europe Ltd. Sandbach, Cheshire, CW113QQ Gran Bretagna; CEREXAGRI BV - Rotterdam (Olanda); Arysta Lifescience Ougrée Production SPRL – Ougrée (Belgio) Stabilimento di rietchettatura: ARCO Logistica S.r.l. – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara Registrazione del Ministero della Salute N° 8874 del 10.06.1996	
Contenuto netto: 0.5-1-2-3-5-10-20 L	Partita n°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 metri da corpi idrici superficiali per gli usi pre-emergenza (barbabetola a semina primaverile e autunnale) e post-emergenza (barbabetola a semina autunnale).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: ETOFUM-FL è un diserbante selettivo che viene impiegato per il diserbo della barbabetola da zucchero a semina primaverile e autunnale. Il prodotto agisce per assorbimento radicale e fogliare sulle infestanti quando sono in fase di germinazione o allo stadio giovanile.

Si consiglia di impiegare il prodotto in miscela con altri erbicidi ad azione complementare quali ad esempio formulati a base di metamitron, lenacil, fenmedifam, ecc...

ETOFUM-FL è efficace contro le seguenti principali infestanti: *Avena* spp. (Avena), *Alopecurus myosuroides* (Coda di volpe), *Amaranthus retroflexus* (Amaranto), *Anagallis arvensis* (Mordigallina), *Apera spica-venti* (Capellini dei campi), *Digitaria sanguinalis* (Sanguinella), *Poa annua* (Fienarola annuale), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Setaria viridis* (Falso panico), *Solanum nigrum* (Erba morella), *Sonchus oleraceus* (Grespino comune), *Sorghum halepense* da seme (Sorghetta), *Spergula arvensis* (Renaia comune), *Stellaria media* (Centocchio).

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Barbabetola a semina primaverile

- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2 per ettaro in combinazione con formulati a base di Lenacil, Metamitron o altro erbicida complementare, in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione. Nel trattamento di pre emergenza intervenire subito dopo la semina e prima dell'emergenza delle infestanti.
- Post-emergenza: litri 1-1,2/ha in combinazione con formulati a base di Fenmedifam od altro erbicida complementare, in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

Barbabetola a semina autunnale

- Pre-semina o pre-emergenza: litri 2/ha in combinazione con formulati a base di Lenacil o altro erbicida complementare, in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione.
- Post-emergenza: litri 1.2-1.5/ha con 5-6 litri di Fenmedifam o altro erbicida complementare, in 300 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.

(*) Barbabetola da foraggio e bietole rosse, da foglia, da taglio e da costa (colture portaseme)

- Pre-semina o pre-emergenza: 2 L/ha in 300-500 litri di acqua, con leggera incorporazione.
 - Post-emergenza: 1.2-1.5 L/ha in 300-500 litri di acqua, evitando di trattare con temperature superiori ai 25°C.
- Dato l'ampio numero di varietà esistenti prima di procedere con l'applicazione sull'intero appezzamento si consiglia di effettuare preventivamente un saggio su un numero limitato di piante, onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Non superare la dose massima di 1 kg/ha di etofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.

Avvertenza: nei trattamenti di pre-semina e pre-emergenza il prodotto non si deve impiegare su terreni sabbiosi e con alto contenuto di sostanza organica (più del 5%). Dopo il trattamento di pre-emergenza, il terreno deve essere sufficientemente umido; in caso contrario effettuare un intervento irriguo. Nel caso si dovesse effettuare una risemina di altra coltura, realizzare prima un'aratura profonda.

COMPATIBILITÀ: il prodotto è miscibile con i più comuni agrofarmaci registrati per l'uso su barbabetola da zucchero. In caso di dubbio effettuare un saggio preliminare.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Durante il trattamento si consiglia di tenere lontani gli animali domestici e bestiame.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

GESTIONE DELLE RESISTENZA

(*) Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio fitosanitario regionale di pertinenza) in caso di sospetta resistenza.

Uso consentito solo fino allo stadio di sviluppo BBCH 18.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta - Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato - Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali - Non applicare con mezzi aerei - Da non vendersi sfuso - Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua - Operare in assenza di vento - Il contenitore non può essere riutilizzato - Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente