



EVADE™

Erbicida per diserbo e decespugliamento delle aree incolte e per diserbo selettivo dei tappeti erbosi di graminacee

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Composizione di EVADE

Fluoxipir meptil puro g. 2,83 (= 28,8 g/l, pari a 20 g/l di fluoxipir acido) Triclopir trietilammonio puro g. 8,23 (= 83,7 g/l, pari a 60 g/l di triclopir acido) Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P501: Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscience Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona
Tel. +39 0372 709900

Distribuito da: ZAPI S.p.A. – VIA Terza Strada, 12 – Conselve (PD) – Tel. +39 049 9597700

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:

Corteva Agriscience France S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia)
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT)
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG)
ALTHALLER Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Mi)
L.I.F.A. S.r.l. - Vigonovo (VE)
Zapi Ind. Chim. S.p.A. – Conselve (PD)
Sinteco Logistics SpA – S.Giuliano Milanese (MI) (solo ri-etichettatura)
Arco Logistica S.r.l - Ferrara (FE) – Italia (solo ri-etichettatura)

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 750 ml**
1 - 5 - 10 - 20 - 50 litri

Registrazione n. 9422 del 10/11/1997 del Ministero della Sanità
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante non bersaglio e gli organismi acquatici al di fuori della zona da trattare, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 m. quando il prodotto è applicato a pieno campo o a vegetazione bassa e di 10 m. in caso di applicazioni localizzate con lancia a mano su infestanti arbustive di altezza superiore a 50 cm. Per proteggere le acque sotterranee non applicare nel periodo autunnale. Utilizzare guanti adatti durante le fasi di preparazione della miscela, riempimento della botte e applicazione. Nel caso di applicazioni con lancia a mano, indossare indumenti protettivi quali tute in Tyvek, stivali robusti e guanti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Fluoxipir puro 2,83%; Triclopir puro 8,23%; che, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

FLUOXIPIR: negli animali da esperimento: irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene.

TRICLOPIR: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose orofaringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflexia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica. **Controindicazioni:** per Triclopir non provocare il vomito. Consultare un Centro Antiveneni.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

EVADE è un erbicida che agisce per assorbimento fogliare e controlla infestanti erbacee, arbustive e legnose.

AREE INCOLTE (aree industriali, sedi stradali e ferroviarie, aeroporti, aree archeologiche, aree urbane, argini di canali, terreni preparati per il trapianto di forestali):

Contro infestanti erbacee in fase di attiva crescita ed appartenenti ad alcuni generi quali: Amaranto (*Amaranthus*), Cardo (*Cirsium*), Farinello (*Chenopodium*), Grespino (*Sonchus*), Malva (*Malva*), Morella (*Solanum*) e Ortica (*Urtica*), impiegare EVADE in pieno campo alla dose di 4-8 l/ha con volumi d'acqua di 200-600 l/ha. In caso di applicazioni localizzate o su limitate porzioni di campo per infestazioni a macchia, impiegare 1-1,5 l/ha, non superando la dose di 8 l/ha di EVADE.

Contro infestanti arbustive e legnose in fase di attiva crescita ed appartenenti a generi quali: Ailanto (*Ailanthus*), Albero di Giuda (*Cercis*), Betulla (*Betula*), Biancospino (*Crateagus*), Clematide (*Clematis*), Corniolo (*Cornus*), Caprifoglio o Madreselva (*Lonicera*), Frassino (*Fraxinus*), Gelso (*Morus*), Olmo (*Ulmus*), Ontano (*Alnus*), Pruno (*Prunus*), Quercia (*Quercus*), Ranno (*Rhamnus*), Robinia (*Robinia*), Rovo (*Rubus*), Salice (*Salix*), Sambuco (*Sambucus*) e Sorbo (*Sorbus*), impiegare EVADE in pieno campo alla dose di 6-8 l/ha con volumi di acqua di 200-600 l/ha.

In caso di **applicazioni localizzate su cespugli con altezza non superiore a 1 metro**, impiegare EVADE alla dose di 1,5-2 litri/ha, trattando non più del 20% della superficie unitaria. Per **applicazioni su cespugli di altezza superiore a 1 metro** si consiglia di ridurre la loro chioma e di impiegare EVADE non appena che i germogli siano ricresciuti.

EVADE può essere utilizzato anche per devitalizzare le **ceppaie recise**. Applicare il prodotto diluito in acqua (da 1:3 fino a 1:5) sulla superficie appena recisa, per mezzo di spennellature, in qualsiasi periodo dell'anno.

TAPPETI ERBOSI AD USO ORNAMENTALE E SPORTIVO:

Contro infestanti erbacee in fase di attiva crescita (periodo primaverile e autunnale) ed appartenenti ad alcuni generi quali: Amaranto (*Amaranthus*), Cardo (*Cirsium*), Farinello (*Chenopodium*), Grespino (*Sonchus*), Malva (*Malva*), Morella (*Solanum*) e Ortica (*Urtica*), impiegare EVADE applicando da 4 a 8 l/ha (in funzione del grado di infestazione) in 200-600 l/ha di acqua, 3-4 giorni prima o dopo il taglio del tappeto erboso. Si consiglia di effettuare l'applicazione su tappeti erbosi in buone condizioni vegetative. **Attenzione: non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento, segnando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del prodotto.**

EPOCA DI APPLICAZIONE: impiegare EVADE dalla primavera fino all'autunno inoltrato su infestanti in attiva vegetazione e che abbiano già sviluppato una adeguata superficie fogliare. Effettuare un solo trattamento per stagione, sia nelle aree incolte che nei tappeti erbosi.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: evitare che il prodotto possa venire a contatto di colture sensibili quali vite, fruttiferi, pioppo, colture erbacee e piante ornamentali.

Sia nelle applicazioni di pieno campo che in quelle localizzate, impiegare non più di 8 l/ha di EVADE, corrispondenti ad una dose massima di 480 g/ha di triclopir espresso come acido equivalente.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-0372 709900/709999 (O.U.)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art.7 comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01/10/2024



ETICHETTA PER CONFEZIONI IN FORMATO RIDOTTO

EVADE™

ERBICIDA

Composizione di EVADE

Fluroxipir meptil puro g. 2,83 (= 28,8 g/l, pari a 20 g/l di fluroxipir acido)
Triclopir trietilammonio puro g. 8,23 (= 83,7 g/l, pari a 60 g/l di triclopir acido)
Coformulanti q.b. a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: **H317:** Può provocare una reazione allergica cutanea. **H410:** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **EUH401:** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: **P280:** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. **P302+P352:** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. **P501:** Smaltire il contenuto/recipiente in accordo con la normativa vigente.

Corteva Agriscience Italia s.r.l. – Via dei Comizi Agrari, 10 – 26100 Cremona
Tel. +39 0372 709900

Taglie autorizzate: **10 - 20 - 50 - 100 ml**

Registrazione n. 9422 del 10/11/1997 del Ministero della Sanità
Partita n. Vedere sulla confezione

PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI SUL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art.7 comma 1, D.P.R. n. 55/2012 con validità dal 01/10/2024



TM ® Marchi registrati di Corteva Agriscience e delle società affiliate

Fitogest®

Etichetta tratta da www.fitogest.com®

