

FOLPEC 80 WG ADVANCE

Fungicida organico per la difesa di vite e pomodoro
in granuli idrodispersibili

FOLPEC 80 WG ADVANCE - Registrazione Ministero della Salute n° 13485 del 14/01/2013

Composizione:		Contenuto netto:
100g di prodotto contengono		0,1-0,2-0,25-0,5 1 5 10-20 kg
Folpet puro	g. 80	
Coformulanti q.b. a	g. 100	Partita n°

Ascenza AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal – Portogallo
Tel. +39 02 84944669

Stabilimento di produzione: Ascenza AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-852 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Distributore: Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA) – Tel 0284944669

Stabilimento di Ri-etichettatura: Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.

REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per la protezione degli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie, quando si usano tecniche di applicazione standard: 10 m per uva da vino e pomodoro in campo destinato al consumo come fresco; 3 m per pomodoro in campo destinato ad usi industriali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastro-intestinale (bruciori gastroe-sofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

DOSI, MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Fungicida organico per la difesa di vite e pomodoro, di copertura con attività preventiva, che agisce essenzialmente impedendo la germinazione delle spore dei funghi e la crescita del micelio. E' caratterizzato da una buona persistenza d'azione, da attribuirsi anche alla sua ottima resistenza al dilavamento.

Sulla vite è attivo contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) e l'Escoriosi (*Phomopsis viticola*). Nei confronti della Peronospora manifesta in particolare un'ottima attività nella protezione del grappolo. Esercita inoltre buona efficacia contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*). Possiede attività collaterale su Marciume nero (*Guignardia bidwellii*).

Sul pomodoro contro *Alternaria spp.*, *Cladosporiosi (Cladisorium fulvum)*, *Colletotrichum spp.*, *Septoria lycopersici* e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).

VITE (Uva da vino)

- Escoriosi (*Phomopsis viticola*) iniziare con un trattamento alla ripresa vegetativa seguito da un altro quando si intravedono le prime foglioline emergenti, continuare con i normali trattamenti antiperonosporici. Dose: 150-750 g/hl (1.5 kg/ha)

- Marciume nero (*Guignardia bidwellii*). Dose: 150-750 g/hl (1.5 kg/ha)

- Peronospora (*Plasmopara viticola*), Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e continuare attenendosi alle disposizioni dei programmi di protezione

della zona. Dose: 150-750 g/hl (1.5 kg/ha).

NON SUPERARE LA DOSE DI 1,5 Kg/ha

POMODORO

In campo

- contro Alternariosi (*Alternaria spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Colletotrichum spp., Septoriosi (*Septoria lycopersici*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).

Dose: 150 g/hl (1.5 kg/ha)

NON SUPERARE LA DOSE DI 1,5 Kg/ha (massimo 4 applicazioni per stagione)

In serra

- contro Alternariosi (*Alternaria spp.*), Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*), Colletotrichum spp., Septoriosi (*Septoria lycopersici*) e Muffa grigia (*Botrytis cinerea*).

Dose: 200 g/hl (2 kg/ha)

NON SUPERARE LA DOSE DI 2 Kg/ha (massimo 3 applicazioni per stagione)

COMPATIBILITÀ: il prodotto non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuri e Oli Bianchi.

FITOTOSSICITÀ: Devono trascorrere 20 giorni da una applicazione di olii minerali. Manifesta un'azione inibente lo sviluppo dei lieviti della vinificazione: sulle uve da vino i trattamenti devono essere sospesi 40 giorni prima della raccolta per non ostacolare la fermentazione dei mosti.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti: 28 giorni per vite da vino - 7 giorni per pomodoro.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO
NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

FOLPEC 80 WG ADVANCE

**Fungicida organico per la difesa di vite e pomodoro
in granuli idrodispersibili**

FOLPEC 80 WG ADVANCE - Registrazione Ministero della Salute n° 13485 del 14/01/2013

Composizione:

100g di prodotto contengono

Folpet puro

Coformulanti q.b. a

g. 80

g. 100

Contenuto netto:

0,1 kg

Partita n°

Ascenza AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias

2910-440 Setúbal – Portogallo

Tel. +39 02 84944669

Stabilimento di produzione: Ascenza AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910-852 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Distributore: Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA) – Tel 0284944669

Stabilimento di Ri-etichettatura: Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261 Evitare di respirare la polvere e gli aerosol. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/il viso.

REAZIONE: P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



ATTENZIONE

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE