



INDOXAN 45 WDG

FUNGICIDA AD AZIONE ANTIPERONOSPORICA
IN GRANULI IDRODISPERDIBILI PER USO PROFESSIONALE
MECCANISMO D'AZIONE: CODICE FRAC 27

INDOXAN 45 WDG

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

- CIMOXANIL puro	g 45
- Coformulanti q.b. a	g 100

Contiene acido solforico, mono-C12-14-alchil-esteri, sali di sodio

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H373 Può provocare danni agli organi (occhi, sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene: Acido maleico, sale di potassio; Cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/protendere gli occhi/protendere il viso/protendere l'udito. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P330 Sciacquare la bocca. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.

Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300

Officine di produzione e confezionamento:

UPL Europe Ltd. – Sandbach (Gran Bretagna); SBM Formulation Z.I. – Beziers (Francia); SCAM S.p.A. – Modena; S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA).

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523; Agrown Biosciences S.r.l. - Via Monte Grappa 7, 24124 Bergamo - Tel. 0331.440977

Stabilimento di rietichettatura: ARCO Logistica Srl – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara. ARCO Logistica Srl - Via G. Monari 5, 44123 Ferrara; CDM Srl – Via Caduti di Nassirya 1A, Z.A. Le Prese, 31010 Cimadolmo (TV)

Registrazione del Ministero Salute N. 15048 del 25.03.2011

Contenuto netto: Kg 0,050/0,100/0,250/0,500/15/10

UFI: QGCR-W0SY-JVK1-2FSU



ATTENZIONE

ed eradicante (potendo controllare infezioni già in atto) con una persistenza d'azione di 4-5 giorni a seconda delle condizioni climatiche che si verificano dopo l'applicazione e dello stato fenologico e di sviluppo delle colture.

È sempre consigliabile applicare INDOXAN 45 WDG in miscela con prodotti di contatto e/o endoterapici a diverso meccanismo e modalità d'azione.

COLTURE AUTORIZZATE

VITE (da vino e da tavola)

Contro peronospora (*Plasmopara viticola*): impiegare 270 g/ha in un volume d'acqua compreso tra 200 e 1000 L/ha in relazione allo stato vegetativo della coltura. INDOXAN 45 WDG può essere applicato dalla fase di 3-4 foglie vere all'inviaitura intervenendo con criterio preventivo ed osservando un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni. Numero massimo di trattamenti/anno: 4.

Su uva da vino INDOXAN 45 WDG non ha effetti indesiderati sui processi di vinificazione e non altera le proprietà organolettiche del vino. Impiegare il prodotto in miscele con antiperonosporici di copertura multisito.

POMODORO (in campo)

Contro peronospora (*Phytophthora infestans*): impiegare 220 g/ha in un volume d'acqua compreso tra 200 e 1000 L/ha in relazione allo stato vegetativo della coltura. INDOXAN 45 WDG può essere applicato dalla fase di 3-4 foglie vere fino alla maturazione dei frutti, osservando un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni.

Numero massimo di trattamenti/ciclo culturale: 5. Si consiglia di impiegare il prodotto in associazione e/o alternanza con principi attivi a diverso meccanismo d'azione.

PATATA

Contro peronospora (*Phytophthora infestans*): impiegare 270 g/ha in un volume d'acqua compreso tra 200 e 1000 L/ha in relazione allo stato vegetativo della coltura. INDOXAN 45 WDG può essere applicato dalla comparsa del primo getto basale laterale fino al 50% di foglie brunastre, osservando un intervallo tra i trattamenti di 7-10 giorni.

Numero massimo di trattamenti/anno: 6. Si consiglia di impiegare il prodotto in associazione e/o alternanza con principi attivi a diverso meccanismo d'azione.

Preparazione della miscela: versare INDOXAN 45 WDG direttamente nella botte riempita per $\frac{3}{4}$ con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego. In zone dove l'acqua abbia bassa durezza, si consiglia l'utilizzo di agenti anti-schiumogeni.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA: Per evitare o ritardare la comparsa di resistenza INDOXAN 45 WDG deve sempre essere impiegato in via preventiva. È inoltre sempre consigliato l'uso in miscela o alternanza con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione, come indicato in etichetta. Non superare il numero massimo di applicazioni indicate.

COMPATIBILITÀ: INDOXAN 45 WDG è fisicamente compatibile con i prodotti fitosanitari contenenti mancozeb, maneb, metiram, folpet e con le Poltiglie Bordolesi di origine UPL Europe Ltd., alle concentrazioni d'uso raccomandate. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere osservato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E LA RACCOLTA

Uva da vino e da tavola: 28 giorni

Pomodoro da industria: 10 giorni

Pomodoro da mensa: 3 giorni

Patata: 7 giorni

ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato





Etichetta in formato ridotto per le taglie fino a 100 g



INDOXAN 45 WDG

FUNGICIDA AD AZIONE ANTIKERONOSPORICA
IN GRANULI IDRODISPERDIBILI PER USO PROFESSIONALE
MECCANISMO D'AZIONE: CODICE FRAC 27

INDOXAN 45 WDG

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

- CIMOXANIL puro	g	45
- Coformulanti q.b. a	g	100

UFI: QGCR-W0SY-JVK1-2FSU



Contiene acido solforico, mono-C12-14-alchil-esteri, sali di sodio

INDICAZIONI DI PERICOLO

H302 Nocivo se ingerito. H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto. H373 Può provocare danni agli organi (occhi, sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH208 Contiene: Acido maleico, sale di potassio; Cimoxanil. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260 Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/protendere gli occhi/protendere il viso/protendere l'udito. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: in presenza di malessere, contattare un CENTRO ANTI-VELENI/un medico. P308+P313 IN CASO DI esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P314 In caso di malessere, consultare un medico. P330 Sciacquare la bocca. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P405 Conservare sotto chiave. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

UPL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.

Claudius Prinsenlaan 144 A, 4818 CP, Breda, NOORD-BRABANT, The Netherlands Tel. +31 (0) 850712300

Officine di produzione e confezionamento: UPL Europe Ltd. – Sandbach (Gran Bretagna); SBM Formulation Z.I. – Beziers (Francia); SCAM S.p.A. – Modena; S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A. – Cotignola (RA)

Distribuito da: UPL ITALIA S.r.l. - Via Terni 275, S. Carlo di Cesena (FC) Tel. 0547 661523; Agrown Biosciences S.r.l. - Via Monte Grappa 7, 24124 Bergamo - Tel. 0331.440977

Stabilimento di rietichettatura: ARCO Logistica Srl – Via A. Battistella 22, 44123 Ferrara. ARCO Logistica Srl - Via G. Monari 5, 44123 Ferrara; CDM Srl – Via Caduti di Nassiriyah 1A, Z.A. Le Prese, 31010 Cimadolmo (TV)

Registrazione del Ministero Salute N. 15048 del 25.03.2011

Contenuto netto: Kg 0,050/0,100

PARTITA N°

Caratteristiche e istruzioni per l'uso

Prima dell'uso leggere attentamente il Foglio Illustrativo allegato.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO