

Coltura	Avversità	Dose Kg/ha	Note	N° max di applicazioni all'anno	Intervallo minimo tra i trattamenti (giorni)	Volume di irrorazione (L/ha)	Quantità max di prodotto all'anno (Kg/ha)
MANDORLO	Oidio	1 – 7,5	A partire dallo sviluppo del germoglio	5	7	500 - 1500	40
AGRUMI	Oidio (<i>Oidium spp.</i>), Acari (<i>Eriophyes spp.</i>), Septoria (<i>Septoria spp.</i>)	6 - 10	Da formazione infiorescenza a raccolta	6	5	500 - 2000	60
OLIVO	Oidio (<i>Oidium spp.</i>), Lebbra (<i>Colletotrichum spp.</i>), Occhio di pavone (<i>Cycloconium oleaginum</i>)	6 - 10	A partire da inizio sviluppo frutti	4	7	100 - 2000	30
POMODORO*, PEPERONE*, MELANZANA*	Oidio (<i>Leveillula spp.</i>), Acari	3 – 7,5	A partire dalla terza foglia sviluppata	8	7	100 - 1000	60
PATATA	Oidio (<i>Leveillula spp.</i>)	3 – 6,3	A partire dalla nona foglia sviluppata	6	7	100 - 1000	40
ORTAGGI A STELO, A RADICE, A FOGLIA*	Oidio (<i>Leveillula spp.</i> , <i>Erysiphe spp.</i>)	3,75 - 7,5	A partire dalla terza foglia sviluppata	8	7	100 - 1000	60
ORTAGGI A BULBO, LEGUMI, CAVOLI	Oidio (<i>Leveillula spp.</i> , <i>Erysiphe spp.</i>)	3 – 7,5	A partire dalla terza foglia sviluppata	8	7	100 - 1000	60
CUCURBITACEE *	Oidio (<i>Leveillula spp.</i> , <i>Erysiphe spp.</i>)	3 – 7,5	A partire dalla terza foglia sviluppata	8	7	100 - 1000	60
FRAGOLA*	Oidio (<i>Sphaeroteca spp.</i>), Acari	3 – 7,5	A partire dallo sviluppo della giovane pianta	8	7	100 - 1000	60
CEREALI	Oidio (<i>Erysiphe</i> = <i>Blumeria graminis</i>)	5 - 8	Da inizio accestimento	3	14	100 - 1000	20
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Oidio (<i>Erysiphe betae</i>), Cercospora (<i>Cercospora beticola</i>)	5 – 7,5	A partire dall'ottava foglia sviluppata	5	7	100 - 1000	40
SOIA	Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>)	4	Da primo germoglio laterale visibile	8	7	100 - 1000	60
GIRASOLE	Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>)	4	A partire da allungamento dello stelo	2	7	500 - 1000	10
LUPPOLO	Oidio (<i>Podosphaera macularis</i>)	6-12	A partire dalla terza foglia distesa	8	7	100- 2000	96
FORESTALI, ORNAMENTALI E FLOREALI	Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>)	3,75 – 5	A partire dalla sesta foglia distesa	12	7	500 - 1000	60

Coltura	Avversità	Dose Kg/ha	Note	N° max di applicazioni all'anno	Intervallo minimo tra i trattamenti (giorni)	Volume di irrorazione (L/ha)	Quantità max di prodotto all'anno (Kg/ha)
TABACCO	Oidio (<i>Erysiphe spp.</i>)	4	A partire dalla sesta foglia distesa	8	7	100 - 1000	32
PICCOLI FRUTTI*	Oidio (<i>Sphaerotheca mors-uae</i>)	5-7,5	Prima comparsa fiori	5	7	100- 1000	30
	Acari (<i>Cecidophyopsis ribis</i>)	7,5					

* Utilizzo consentito anche in serra

AVVERTENZA: a temperature elevate ed alle alte dosi, il prodotto può risultare fitotossico. Si consiglia pertanto l’impiego, alle dosi consigliate, nelle ore più fresche della giornata.

UTILIZZO DEL PRODOTTO: Versare MICROTHIOL® DISPERSS® direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua mantenendo l’agitatore spento; aggiungere poi il rimanente quantitativo d’acqua previsto per l’impiego, attendere la completa dispersione del prodotto e successivamente avviare l’agitatore. La particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili rende agevole la preparazione della miscela.

COMPATIBILITÀ. Il prodotto non è compatibile con antiparassitari alcalini, Captano, Oli Minerali. MICROTHIOL® DISPERSS® è compatibile con la maggior parte degli agrofarmaci attualmente autorizzati, in caso di dubbio si consiglia comunque una prova preliminare su piccola scala. Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall’impiego degli Oli minerali e del Captano. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ. Il prodotto può essere fitotossico sulle seguenti cultivar:
Mele: Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Golden Delicious, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.
Pere: Buona Luisa d’Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.
Al fine di evitare eventuali effetti fitotossici si raccomanda di effettuare saggi preliminari su vitigni sensibili in caso di trattamenti alle dosi più alte.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Da non vendersi sfuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d’acqua. Operare in assenza di vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente.