

# XANILO 45 WG

**Fungicida in granuli idrodispersibili****XANILO 45 WG - Composizione**Cimoxanil ..... g. 45  
Coformulanti e inerti q.b. a ..... g. 100**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospetto di nuocere al feto.

H373 Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH208 Contiene Cymoxanil. Può provocare una reazione allergica.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE****CONSIGLI DI PRUDENZA**

P260 Non respirare la polvere/gli aerosol.

P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.

P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P405 Conservare sotto chiave.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

**TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE**

SIPCAM OXON S.p.A.

Sede legale: via Carroccio, 8 - Milano

Tel. 02/353781

**PRODOTTO FITOSANITARIO**

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12548 del 23.12.05

**Officine di produzione e confezionamento:**

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Jiangyin Suli Chemical Co. Ltd., Cina

**Distribuito da:**

Agrowin Biosciences s.r.l. - via Montegrappa 7, Bergamo

**Taglie:** g. 100 - 250 - 500 Kg. 1 - 5 - 10 - 20**Partita n°** .....**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante la miscelazione/caricamento del prodotto indossare guanti e indumenti protettivi.

Per l'applicazione in pieno campo con trattore non cabinato, indossare guanti e indumenti protettivi.

Per l'applicazione in pieno campo con trattore cabinato, indossare indumenti protettivi.

Per l'applicazione in serra indossare: guanti, indumenti protettivi, cappuccio e maschera (FFP2).

Dopo l'applicazione, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazione di rifinitura manuale su vite prima che siano trascorsi tre giorni dall'ultima applicazione del prodotto. Trascorsi tre giorni, è possibile effettuare operazioni di rifinitura manuale indossando i guanti.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Cimoxanil (derivato dell'urea). Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono

citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: nessuna.

**AVVERTENZA:** consultare un Centro Antiveneni.**Caratteristiche**

Il prodotto è un fungicida ad azione citotropica translaminare, efficace contro la peronospora; agisce per contatto sulle zoospore germinanti e, penetrando nei tessuti vegetali, è anche in grado di colpire il micelio nei primissimi stadi di sviluppo.

**Epoche, dosi e modalità d'impiego**

Iniziare i trattamenti preventivi non appena inizia il pericolo di infezioni peronosporiche. Viste le peculiari modalità di azione del prodotto (citotropicità, curatività) è sempre consigliabile usarlo in miscela con prodotto di contatto e/o endoterapici a diverso meccanismo e modalità d'azione. Per cipolla trattare fino alla fase di metà delle piante con foglie coricate e per carciofo trattare fino alla fase di raggiungimento del 50% della massa fogliare.

		Dose g/hl	Dose g/ha	Max N° applicazioni	Min. N° gg tra applicazioni
Vite		30-35	300-330	4	7
Patata		30-35	300-330	5	7
Pomodoro, Melanzana	Pieno campo	30-35	300-330	5	7
	Serra	30-35	300-330	5	7
Melone, Anguria, Zucca	Pieno campo	30-40	300-400	4	8
Zucchini, Cetriolo	Pieno campo	30-40	300-400	4	8
	Serra	25-30	270	4	8
Lattughe	Pieno campo	30-40	300-400	4	8
Spinaci	Pieno campo	30-40	300-400	4	8
Cipolla	Pieno campo	40-50	400-500	4	8
Carciofo	Pieno campo	30-40	300-400	3	8

**Preparazione della poltiglia:** Per garantire una migliore efficacia del prodotto, si consiglia di acidificare la soluzione a valori di pH compresi tra 5 e 6.

Qualora si utilizzino apparecchiature a basso volume impiegare la dose di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con attrezzatura a volume normale.

**Compatibilità:** il prodotto è compatibile con tutti gli antiparassitari a reazione neutra o acida. Si sconsiglia di usarlo in associazione a prodotti con reazione alcalina ed oli minerali. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.**Gestione delle resistenze:**

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare XANILO 45 WG ad altri fungicidi.

**Avvertenza:**

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.



## ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

### Sospendere i trattamenti:

28 giorni prima della raccolta per vite;

14 giorni prima della raccolta per carciofo;

11 giorni prima della raccolta per melone, anguria, zucca, 10 giorni prima della raccolta per lattughe, spinaci e cipolla;

7 giorni prima della raccolta per patata;

3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, zucchini, cetriolo.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Operare in assenza di vento; Da non venderci sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

OGGESTI.COM



# XANILO 45 WG

Fungicida in granuli idrodispersibili

## XANILO 45 WG - Composizione

Cimoxanil .....g. 45  
Coformulanti e inerti q.b. a ..... g. 100



### INDICAZIONI DI PERICOLO

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospetto di nuocere al feto.  
H373 Può provocare danni agli organi (sangue, timo) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH208 Contiene Cimoxanil. Può provocare una reazione allergica.  
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



### CONSIGLI DI PRUDENZA

P260 Non respirare la polvere/gli aerosol.  
P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.  
P308 + P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: consultare un medico.  
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.  
P405 Conservare sotto chiave.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

### ATTENZIONE

### TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE

SIPCAM OXON S.p.A.  
Sede legale: via Carroccio, 8 - Milano  
Tel. 02/353781

### PRODOTTO FITOSANITARIO

Autorizzazione Ministero della Salute n. 12548 del 23.12.05

### Officine di produzione e confezionamento:

SIPCAM OXON S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)  
Jiangyin Suli Chemical Co. Ltd., Cina

### Distribuito da:

Agrowin Biosciences s.r.l. - via Montegrappa 7, Bergamo

Taglie: g. 100

Partita n° .....

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Durante la miscelazione/caricamento del prodotto indossare guanti e indumenti protettivi.

Per l'applicazione in pieno campo con trattore non cabinato, indossare guanti e indumenti protettivi.

Per l'applicazione in pieno campo con trattore cabinato, indossare indumenti protettivi.

Per l'applicazione in serra indossare: guanti, indumenti protettivi, cappuccio e maschera (FFP2).

Dopo l'applicazione, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazione di rifinitura manuale su vite prima che siano trascorsi tre giorni dall'ultima applicazione del prodotto. Trascorsi tre giorni, è possibile effettuare operazioni di rifinitura manuale indossando i guanti.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Cimoxanil (derivato dell'urea). Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica. Controindicazioni: nessuna.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveneni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2 luglio 2019 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 4 gennaio 2020